### Murin de Beschtein

Ordre: Chiroptères

Famille : Vespertillionidés

Code Natura 2000 : 1323 Numéro de fiche: 19

## STATUT DE PROTECTION

Directive « Habitats »: Annexe II&IV Convention de Berne : Annexe II Convention de Bonn : Annexe II Liste rouge mondiale : vulnérable Liste rouge française : vulnérable

Liste rouge régionale (élaboration en cours) : rare



© B. Ascargota

# Description

Espèce forestière sédentaire mais très mobile (déplacements fréquents entre gîtes) à court rayon journalier (2 ou 3 Km), son régime alimentaire semble assez opportuniste, privilégiant un peu plus diptères et lépidoptères.

Myotis beschteini

# **Habitats**

Gîtes d'été généralement dans les cavités arboricoles (trous de pics en particulier); assez exceptionnellement aussi en bâtiments. L'espèce utilise des arbres adultes ou vieux, même de faible hauteur.

Gîtes d'hiver en cavités souterraines.

Ses territoires de chasse sont assez strictement forestiers mais peuvent comprendre des clairières et des structures lâches (type verger).

Préférence marquée pour les dominantes feuillues.

Craint la fragmentation de ses habitats forestiers.

# **Etat de conservation national**

Il s'agit de l'espèce à plus faible effectif parmi les 12 de l'annexe 2 de la Directive Habitats en France avec moins de 800 individus estimés en hiver et moins de 200 en été (lors de la synthèse 1999 de la SFEPM).

Les tendances sont donc très difficiles à dégager.

Elle peut être localement assez commune (dans certains massifs forestiers).

Elle semble encore nettement plus rare dans la partie méditerranéenne.

#### Etat des populations sur le site

Régionalement, le Murin de Bechstein n'est connu comme présent qu'en Lozère et sur ses confins.

L'espèce est présente en marge immédiate du site (Gorges de la Jonte) et il est probable que les forêts subnaturelles des versants constituent son milieu de prédilection; mais les parties forestières du site constituent des milieux de chasse potentiels, voire abritent des gîtes de transit.

### Importance du site pour la conservation de l'espèce

Compte tenu de la rareté de l'espèce, particulièrement sur notre région où elle peut être considérée comme en limite de répartition, le site revêt une certaine importance. On la qualifierait de forte en cas de découverte de site de reproduction ou d'hivernage.

CPIE des Causses Méridionaux Rapport final Avril 2011 p 51