

## Pipit rousseline *Anthus campestris*

Code Natura 2000 : A255

Numéro de fiche : 32

### STATUT DE CONSERVATION

Directive Oiseaux : Annexe I

Convention de Berne : Annexe II

Birds in Europe (2004) : SPEC 3

Liste Rouge française : CMAP 5 ; A surveiller

Liste Rouge Languedoc-Roussillon : LR 15



Pipit rousseline - Illustration extraite du *Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France*, ed. S.O.F.

### Description

Passereau marcheur et coureur typique des milieux ouverts (dunes, pelouses...). Il se caractérise par sa grande taille et sa longue queue qui le fait ressembler à une grosse bergeronnette. Sa coloration globalement beige-grisâtre qui lui sert de camouflage est typique, avec un grand bec long et rose-orangé et un large sourcil blanchâtre. Les deux sexes sont similaires, mais le mâle a une coloration plus brillante. L'espèce est strictement insectivore et donc migratrice, elle arrive entre fin mars et fin avril. Des regroupements sont observés sur des zones traditionnelles en août puis la migration d'automne est maximale vers le 15 septembre.

### Habitats

Nicheur au sol, cet insectivore niche dans les milieux divers pourvu qu'ils soient ouverts, secs, ensoleillés, et que le terrain soit en partie nu. Il fréquente aussi bien les dunes littorales, les sansouïres, les pelouses à manades, les landes à thym, les garrigues dégradées, les plaines agricoles et viticoles, les Causses.

Mêmes dans les secteurs bien occupés, où il apparaît commun (Costières du Gard, Gardonnenque...), les densités restent faibles, de l'ordre de 0.1 à 2 couples au 10 ha. Niche jusqu'à 1200 m (massif du Lingas) voire 1400 m d'altitude.

### Etat des populations sur le site

De l'ordre de 20 à 65 couples, les populations recensées et estimées sur le site ne sont pas très importantes, mais occupent presque toute la zone, avec des secteurs de plus grande densité. Par rapport aux autres Causses où les populations ont décliné depuis une vingtaine d'années, le Causse noir gardois abrite des populations stables.

### Etat de conservation national

Limité à une grande moitié sud de la France, la population nationale a été estimée entre 20 et 30 000 couples, représenterait moins de 5 % de la population européenne qui est essentiellement ibérique (D'ANDURAIN *et al.*, 1999). Faute de connaissances précises sur les effectifs et tendances des populations locales, l'espèce est classée « à surveiller » malgré des quelques signaux de déclin.

### Importance du site pour la conservation de l'espèce

En Languedoc-Roussillon, les effectifs ne sont pas connus mais doivent représenter plus de 25% de la population française, et la tendance semble être au déclin du fait de la fermeture généralisée des milieux. Le site n'est pas très essentiel pour l'espèce à l'échelle régionale ou nationale, mais à l'échelle des Causses, il est sans doute celui qui abrite l'un des plus belles populations.

### **Propositions de gestion**

L'entretien des milieux ouverts et herbacés par les activités traditionnelles sur les parcours ovins est la première des mesures à privilégier. L'ouverture de milieux par débroussaillage puis pâturage sur des zones plus fermées serait à favoriser pour cette espèce, mais pourrait être contradictoire avec les besoins d'autres (Engoulevent, Ortolan...), elle doit être menée avec prudence. Enfin des mesures de lutte raisonnée et utilisation réduite de phytosanitaires lui seraient bénéfiques.

Au contraire les reboisements, l'agriculture intensive ou l'abandon des terres sont des menaces, pour cette espèce comme d'autres.

### **Références bibliographiques utilisées**

D'ANDURAIN P., CRAMM P. & OLIOSSO G. (1999) : Pipit rousseline, pages 424-425. In ROCAMORA G. & D. YEATMAN-BERTHELOT : Oiseaux menacés et à surveiller en France. Listes rouges et recherche de priorités. Populations. Tendances. Menaces. Conservation. SEOF/LPO, Paris. 560 pages.

GRIVE (2001) : Les espèces d'oiseaux de l'Annexe 1 de la Directive Oiseaux en zone de garrigues et maquis. Document pour DIREN-LR. 94 pages.

DUBOIS P.J. & M. VASLIN (à paraître) : Pipit rousseline *Anthus campestris*. Cahiers d'habitats d'oiseaux - Natura 2000.